

【食道癌】

No.	レジメン名	抗がん剤(商品名)	抗がん剤(一般名)	用量	用法	スケジュール	1クール	催吐性	支持療法
11	FP療法	フルオロウラシル	フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注 24時間持続	day 1~5	21日	高度	アプレピタント(内服) パロノセトロン注 デカドロン錠(内服・任意) デキサート注 フロセミド注 硫酸Mg補正液 ハイドレーション用輸液
		シスプラチン	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 120分以上	day 1			
129	術前FP療法	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 120分	day1	21日 2サイクル	高度	アプレピタント(内服) パロノセトロン注 デカドロン錠(内服・任意) デキサート注 フロセミド注 硫酸Mg補正液 ハイドレーション用輸液
		フルオロウラシル	フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注 24時間	day1-5			
133	CDDP+5-FU療法 (進行・再発)	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 120分	day1	28日	高度	アプレピタント(内服) パロノセトロン注 デカドロン錠(内服・任意) デキサート注 フロセミド注 硫酸Mg補正液 ハイドレーション用輸液
		フルオロウラシル	フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注 24時間	day1-5			
136	術前DCF療法	シスプラチン	シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注 2時間	day1	21日 最大3サイクル	高度	アプレピタント(内服) オランザピン錠(内服) パロノセトロン注 デカドロン錠(内服・任意) デキサート注 マンニトール注 硫酸Mg補正液 アスパラギンK注 ハイドレーション用輸液
		ドセタキセル	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注 1時間	day1			
		フルオロウラシル	フルオロウラシル	750mg/m ²	点滴静注 24時間	day1-5			