

【膵癌】

No.	レジメン名	抗がん剤(商品名)	抗がん剤(一般名)	用量	用法	スケジュール	1クール	催吐性	支持療法
33	GEM+S-1療法	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,15	28日	軽度	グラニセトロン注 デキサート注
		エスワン	テガフル,ギメラシル, オテラシルカリウム	40mg/m ² /回	内服(1日2回)	day1~14			
8・5	ゲムシタビン単剤療法	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15	28日	軽度	グラニセトロン注 デキサート注
59	nab-PTX + ゲムシタビン	アブラキサン	nab-パクリタキセル	125mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15	28日	軽度	パロノセトロン注 デキサート注
		ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15			
64	FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 120分	day1	14日	中等度	アプレピタント(内服)
		レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	点滴静注 120分	day1			
		イリノテカン	イリノテカン	180mg/m ²	点滴静注 90分	day1			
		フルオロウラシル	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注 30分	day1			
		フルオロウラシル	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 46時間	day1-3			
140	オニバイド+5FU/LV療法	オニバイド	リポソーマル・イリノテカン	70mg/m ²	点滴静注 90分	day1	14日	中等度	パロノセトロン注 デキサート注
		レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	点滴静注 120分	day1			
		フルオロウラシル	フルオロウラシル	2400mg/m ²	インフューザー 46時間	day1-2			

【胆道癌】

No.	レジメン名	抗がん剤(商品名)	抗がん剤(一般名)	用量	用法	スケジュール	1クール	催吐性	支持療法
20	CDDP+GEM療法	シスプラチン	シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注 60分	day 1, 8	21日	高度	アプレピタント(内服) パロノセトロン注 デキサート注
		ゲムシタビン	ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day 1, 8			
32	GEM+S-1療法	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8	21日	軽度	パロノセトロン注
		エスワン	テガフル,ギメラシル, オテラシルカリウム	60,80,100mg/body/day	内服	day1~14			
56	S-1 + CDDP療法	エスワン	テガフル,ギメラシル, オテラシルカリウム	80mg/m ²	内服(1日2回)	day1~14	21日	高度	パロノセトロン注 デキサート注
		シスプラチン	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注 120分	day1			
69	GEM + S-1療法	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,15	28日	軽度	グラニセトロン注
		エスワン	テガフル,ギメラシル, オテラシルカリウム	80mg/m ²	内服(1日2回)	day1-14			